



Circoncision

CHU
de Liège

Citadelle
Pédiatrie

La circoncision, qu'est-ce que c'est ?

C'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever le prépuce qui recouvre le gland du pénis.

Avant l'opération

Pour aller au bloc opératoire, votre enfant devra :

- _ Avoir vu l'anesthésiste. Vous recevrez un carnet avec toutes les informations pour l'opération. Vous y trouverez aussi les consentements à la chirurgie et à l'anesthésie que vous devrez signer avant l'opération.
- _ Rester à jeun (pas boire, pas manger) 8h avant. Il pourra peut-être boire de l'eau sur consigne de l'anesthésiste.
- _ Aller se laver avec le produit adapté donné par les infirmiers si ça n'a pas été fait à la maison (la veille au soir ou le jour-même).
- _ Enfiler une chemise d'opération (sans sous-vêtements) avec un linge propre.
- _ Si votre enfant présente de la toux, un nez qui coule, de la fièvre, des diarrhées et/ou vomissements, signalez-le à l'équipe infirmière.

Après l'opération

- _ Vous pourrez rejoindre votre enfant en salle de réveil.
- _ Il y aura une compresse déposée sur la verge de votre enfant. Celle-ci sera retirée dès la première urine.
- _ Les soins vous seront montrés par l'équipe infirmière. A chaque change, il vous sera demandé de mettre la pommade prescrite par le chirurgien (Neobacithracine® ou Vaseline®) sur les sutures.
- _ Des antidouleurs seront donnés d'office pendant les 24 premières heures pour éviter l'apparition de la douleur. Si celle-ci est tout de même présente, n'hésitez pas à appeler l'équipe infirmière.
- _ En règle générale et selon l'état de votre enfant, vous pourrez repartir le jour-même.


Consignes pour le retour à domicile

A la maison, vous devrez surveiller les points suivants :

- _ Pas de bain pendant 8 jours, pas de piscine pendant 15 jours. Les douches sont autorisées.
- _ Éviter les lingettes qui risquent de piquer au niveau de la plaie.
- _ Continuer à mettre la même crème 3 à 4x/jour pendant au moins 5 jours ou suivant les consignes du chirurgien.
- _ Vérifier que votre enfant urine, surtout les premiers jours, car un gonflement postopératoire peut survenir.
- _ Les fils sont résorbables et tomberont tout seuls après 3 à 4 semaines.
- _ Privilégier les vêtements amples.
- _ Contacter les urgences ou votre médecin traitant si :
 - _ Vous remarquez un saignement actif.
 - _ Votre enfant fait de la température.
 - _ La douleur est incontrôlable malgré les antidouleurs prévus.
 - _ Votre enfant n'arrive plus à uriner.

Le chirurgien vous donnera les consignes pour la reprise de l'école et du sport.

L'équipe vous souhaite un bon retour.



Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 45 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

