



## Cure de jonction pyélo-urétérale ou pyéloplastie


**CHU**  
de Liège

**Citadelle**  
Pédiatrie



Le système urinaire se compose :


- \_ De 2 reins qui filtrent le sang et fabriquent l'urine
- \_ De 2 uretères qui acheminent l'urine vers la vessie
- \_ D'une vessie qui est un réservoir permettant de récolter l'urine
- \_ D'un urètre qui permet l'évacuation de l'urine vers l'extérieur.



## La pyéloplastie, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'opération qui vise à faire une réparation de la zone rétrécie entre le bassinet (juste après le rein) et l'uretère (tuyau entre le rein et la vessie) pour que l'urine puisse de nouveau s'écouler normalement.

Cette maladie peut rester asymptomatique ou bien se décompenser au fil de la vie. Dans ce cas, elle provoque des douleurs sourdes et répétées au niveau du rein lors de boissons abondantes ou encore des infections urinaires fébriles à répétition, la formation de calcul,... A terme, elle provoque la destruction du rein.



## Avant l'opération

Pour aller au bloc opératoire, votre enfant devra :

- \_ Avoir vu l'anesthésiste. Vous recevrez un carnet avec toutes les informations pour l'opération. Vous y trouverez aussi les consentements à la chirurgie et à l'anesthésie que vous devrez signer avant l'opération.
- \_ Rester à jeun (pas boire, pas manger) 8h avant. Il pourra peut-être boire de l'eau sur consigne de l'anesthésiste.
- \_ Aller se laver avec le produit adapté donné par les infirmiers si ça n'a pas été fait à la maison (la veille au soir ou le jour-même).
- \_ Enfiler une chemise d'opération (sans sous-vêtements) avec un linge propre.
- \_ Si votre enfant présente de la toux, un nez qui coule, de la fièvre, des diarrhées et/ou vomissements, signalez-le à l'équipe infirmière.

## Après l'opération

- \_ Vous pourrez rejoindre votre enfant en salle de réveil. Le bloc opératoire nous appelle dès la fin de l'intervention pour que vous soyez là quand il se réveille.
  - \_ En fonction de l'âge de votre enfant, les sutures seront différentes :
    - \_ Bébés : 1 petit pansement
    - \_ Chez les plus grands : plusieurs petits pansementsC'est par là que sont passés les instruments lors de l'opération.
  - \_ Des antidouleurs seront donnés d'office pendant les 24 premières heures pour éviter l'apparition de la douleur. Si celle-ci est tout de même présente, n'hésitez pas à appeler l'équipe infirmière.
- Afin de permettre une bonne cicatrisation, un ou plusieurs drains seront laissés en place après l'opération, selon la technique opératoire du chirurgien et l'âge de votre enfant.
- \_ Un drain de néphrostomie : fin tuyau qui part du bassin et ressort à la peau du côté opéré. Un petit sachet sera collé par-dessus pour récolter l'urine.
  - \_ Une sonde JJ : invisible, elle est placée entre le bassin et la vessie
- Durant l'hospitalisation, il vous sera demandé de conserver les langes quand vous changez votre enfant pour que nous puissions évaluer la quantité d'urine.
- Le chirurgien vous expliquera combien de temps les drains seront laissés en place et la durée d'hospitalisation.
- \_ Un antibiotique sera prescrit par le médecin pour éviter les infections.
  - \_ Vous pourrez quitter l'hôpital après 1 ou 2 jours.


## Consignes pour le retour à domicile

A la maison, vous devrez surveiller les points suivants :

- \_ Si vous rentrez à la maison avec un drain de néphrostomie, il faudra vérifier que votre enfant urine régulièrement par les voies naturelles. Le drain sera noué et recouvert d'un pansement.
- \_ Contacter les urgences ou votre médecin traitant si :
  - \_ Vous remarquez un saignement actif.
  - \_ Votre enfant fait de la température
  - \_ La douleur est incontrôlable malgré les antidouleurs prévus.
  - \_ Votre enfant n'arrive plus à uriner.
  - \_ Le pansement devient sale.

Le chirurgien vous donnera les consignes pour la reprise de l'école, du sport et la poursuite des antibiotiques.

**L'équipe vous souhaite un bon retour.**



Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 45 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

