

Médecine nucléaire

Dr G. LETESSON, Chef de Service
Tél. : 04/321.68.71
Fax : 04/321.88.18



Nom + prénom :

.....

Date de naissance :/...../.....

ETIQUETTE PATIENT

(date, cachet, signature)

Médecins

Dr F. DAENEN
Dr C. DE LANDSHEERE
Dr M. GKIRGKODIS
Dr G. LETESSON
Dr C. VAN DER REST

Rendez-vous
04/321.68.72

Secrétariat
Mme RAPAGNA
04/321.52.83

<http://www.citadelle.be>

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DENSITOMETRIE OSSEUSE (DEXA)

(CVDR, 11-2022, version 1.1)

MOTIF D'EXAMEN :

ACQUISITION SPECIFIQUE : Avant-bras Corps entier Autre :

DATE DERNIER EXAMEN (si d'application) :/...../..... (remboursé/non-remboursé)

EXAMEN NON REMBOURSE

EXAMEN REMBOURSE : critères ci-dessous : (INAMI 01-04-2022) :

NB : L'examen peut être renouvelé après 5ans, selon les mêmes règles d'application.

Groupe 1 : femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose, à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au 1^{er} ou au 2^e degré.

Groupe 2 : quel que soit l'âge ou le sexe, si au moins un des facteurs suivants est présent :

- Fracture low impact non oncologique de la colonne.
- Antécédents de fracture low impact périphérique, à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale.
- Patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de 3 mois consécutive à un équivalent de >7.5 mg prednisolone/jour.
- Patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique.
- Patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes : arthrite rhumatoïde, hyperthyroïdie évolutive non traitée, hyperprolactinémie, hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par "gonadotrophine-releasing-hormone" (GnRH) analogue), hypercalciurie rénale, hyperparathyroïdie primaire, osteogenesis imperfecta, Maladie/Syndrome de Cushing, anorexia nervosa avec Body mass Index <19kg/m², ménopause précoce (<45 ans).

DONNEES COMPLÉMENTAIRES POUR LE CALCUL DU « FRAX® » (Celui-ci est nécessaire au remboursement) (Critères d'interprétation au verso) :

| | | |
|---|-----|-----|
| ATCD de fracture | OUI | NON |
| Parent ayant eu une fracture de la hanche | OUI | NON |
| Actuellement fumeur | OUI | NON |
| Glucocorticoïdes | OUI | NON |
| Polyarthrite rhumatoïde | OUI | NON |
| Ostéoporose secondaire | OUI | NON |
| Alcool ≥ 3 unités/jour | OUI | NON |

CRITERES D'INTERPRÉTATIONS POUR LES DONNEES DU FRAX® :
 (source : <https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index.aspx?lang=fr>)

| | |
|--|---|
| Fracture antérieure | Une fracture précédente signifie plus précisément une fracture antérieure à l'âge adulte survenue spontanément, ou une fracture résultant d'un traumatisme qui, chez un individu en bonne santé, n'aurait pas provoqué une fracture. |
| Parents ayant eu une fracture de la hanche | Demander s'il y a eu une fracture de la hanche chez la mère ou le père du patient. |
| Actuellement fumeur | Entrez oui ou non selon que le patient fume actuellement du tabac. |
| Glucocorticoïdes | Entrez oui si le patient est exposé aux glucocorticoïdes oraux ou y a été exposé pendant plus de trois mois à une dose de prednisolone de 5 mg par jour ou plus (ou une dose équivalente d'autres glucocorticoïdes). |
| Polyarthrite rhumatoïde | Entrez oui si le patient a un diagnostic confirmé de polyarthrite rhumatoïde. |
| Ostéoporose secondaire | Entrez oui si le patient a des pathologies fortement associées à l'ostéoporose. Ceci inclut le diabète de type 1 (insulino-dépendant), l'osteogenesis imperfecta chez l'adulte, l'hyperthyroïdisme de longue date non-traité, l'hypogonadisme ou la ménopause prématurée (inférieure à 45 ans), la malnutrition chronique, la malabsorption et les maladies chroniques du foie. |
| Alcool trois unités par jour ou plus | Entrez oui si le patient prend 3 unités d'alcool par jour ou plus. Une unité d'alcool varie légèrement d'un pays à l'autre de 8 à 10 g d'alcool. C'est équivalent à un verre standard de bière (285 ml), une mesure unitaire de spiritueux (30 ml), un verre de vin de taille moyenne (120 ml), ou une mesure d'apéritif (60 ml). |